

# DEZINFEKČNÍ ŘÁD

pro ordinace odborných lékařů a ambulance

	Oblast použití	Četnost		Způsob	Dezinfekční prostředek	Příprava	Expoziční doba	Spektrum účinnosti
Plochy	podlahy, stoly, nábytek, okenní parapety, a jiné povrchy, nádoby na odpad	Čekárny, chodby, ordinace: 1 x týdně  WC: 1 x denně  Zámkové sálky: po každém zákroku	obložené stěny, zrcadla, světla, dveře aj.  <u>při velkém úklidu</u>  1 x týdně	běžné detergenty a dezinfekční prostředky	Savo Prim 3%	240 ml / 8 l	z	A,B,T,M,V
				připraveným roztokem vytřít nebo omýt a nechat zaschnout	Dezox 1%	80 ml / 8 l	z	A,B,T,M
					Desam GK 1,5%	120 ml / 8 l	z	A,B,T,M,V
					Surfalyse 0,25%	20 ml / 8 l	z	A,B,V
					Mikasept GAL 2%	160 ml / 8 l	z	A,B,V
			jednou měsíčně zaměnit dezinf. prostředek za jiný s jinou aktivní látkou (minimálně 1 x čtvrtletně)	<u>velký úklid:</u> Chloramin BM 1%	8 lžic / 8 l	z	A,B,T,M,V	
			epidemiologické krizové situace řešit okamžitým nasazením Persteril 0,5% (10% z lékárny)			400 ml / 8 l	10 min	A,B,C,T,M
malé plochy	instrument, stolky, přístroje, atd.	při kontaminaci s biologickým materiálem		nastříkat na plochu a nechat zaschnout	Desprej	konc.	z	A,B,T,M,V
sanitární zar.	WC, umývadla, výlevky podložní mísy	vany a podložní mísy ihned po použití  2 x denně		dokonale smočít dez. prostředkem, nalít i do sifonu, nechat působit, mechanicky vyčistit a opláchnout	Chloramin BM 2% Savo Prim 3%	10 lžic / 5 l 150 ml / 5 l	30 min. 30 min.	A,B,T,M,V A,B,T,M,V
nesouje a pomůcky	chirurgické instrumenty, stříkačky, kanyly, pomůcky na více použití apod.	po použití		zcela ponořit do připraveného roztoku, po vytažení očistit, opláchnout pitnou vodou, sterilizovat  nejlépe každý týden (min. však jednou za měsíc) zaměnit dez. prostředek za jiný s jinou aktivní látkou	Mikasept GALEN 2% Korsolex 3% Dezipur 2% Chirox 3% Jodonal B 2% Persteril 0,5% (10% z lékárny)	20 ml / 1 l 30 ml / 1 l 20 g / 1 l 30 g / 1 l 20 ml / 1 l 50 ml / 1 l	2 hod. 30 min. 1 hod. 20 min. 30 min. 10 min.	A,B,T,M,V A,B,C,T,M A,B,T,M A,B,T,M,V A,B,T,M,V A,B,C,T,M